

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 4 - 9 - 81846669

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

P. P. N° 47 - 33150 CENON-LA MORLETTE - TÉL. (56) 86.22.75 - 86.24.35

INSEE : 313244255-00016 - INSCRIPTION A LA C.A.P.P.P. N° 524 AD

ABONNEMENT ANNUEL

70,00 F

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46 X

BULLETIN TECHNIQUE N° 27 - MERCREDI 2 SEPTEMBRE 1981

VITICULTURE

MILDIOU

Des taches sont souvent observées sur le feuillage des extrémités de rameaux, il est donc conseillé de tenir les vignes bien rognées.

Dans les jeunes plantations et les zones à encépagement tardif où la végétation est encore active on maintiendra la protection du feuillage dans les prochains jours par une nouvelle pulvérisation cuprique ou organo-cuprique qui favorisera également le bon aoûtement des bois.

BLACK-ROT

Dans les vignobles contaminés les attaques sur grains sont toujours possibles jusqu'à la récolte à partir des précipitations orageuses. Dans ces situations poursuivre la protection avec une spécialité comportant de préférence une association cuivre + mancozèbe ou cuivre + manèbe.

VERS DE LA GRAPPE

Le vol se poursuit. Selon les indications de notre dernier bulletin, une intervention a dû être effectuée dans les secteurs précoces ; la protection est donc assurée.

Dans les situations tardives et plus particulièrement dans les vignobles ayant subi des attaques en 2ième génération, intervenir à la fin de cette semaine par une pulvérisation soigneuse dirigée sur les grappes.

POURRITURE GRISE

(Botrytis)

Nous rappelons que le dernier traitement recommandé par la méthode standard doit être effectué trois semaines avant la vendange (voir le bulletin technique précédent).

.../...

P434

ARBORICULTURE

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER SUR POMACEES

L'activité de cet insecte se poursuit.

Dans les vergers à proximité de pêchers contaminés par la Tordeuse orientale, il est recommandé un traitement dès à présent en respectant le délai de carence des produits.

MINEUSES CERCLEES

(Leucoptera scitella)

Les pontes du troisième vol ont été observées et les éclosions sont en cours.

Dans les plantations dont la production est destinée à l'exportation (Canada ou Egypte notamment), appliquer dès réception du présent bulletin une pulvérisation à base de méthomyl (Lannate) à la dose de 50 g de matière active/hl.

Respecter le délai d'utilisation de cette spécialité qui est fixé à 7 jours avant la récolte.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la circonscription phytosanitaire
"AQUITAINE"

M. LARGE

Imprimerie de la Station de BORDEAUX
Directeur-Gérant : J. THIAULT